

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN IBU HAMIL DENGAN PERFUSI PERIFER TIDAK EFEKTIF PADA KASUS ANEMIA DI RUMAH SAKIT RA. BASOENI MOJOKERTO

OLEH: CITRA AULIA WULANDARI

Perfusi perifer tidak efektif merupakan: penurunan sirkulasi darah ke jaringan perifer yang dapat mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien perfusi perifer tidak efektif pada ibu hamil dengan anemia. Metode penelitian yaitu studi kasus. Pemberian asuhan keperawatan mulai pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan dan evaluasi keperawatan. Partisipan pada penelitian ini yaitu dua klien perempuan usia 28 tahun dan 25 tahun dengan anemia di ruang VK RS RA. BASOENI Mojokerto dengan kriteria penurunan hemoglobin di bawah 11gr/dl. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam di dapatkan hari pertama perawatan belum menunjukkan kriteria hasil yang di harapkan. Pada hari kedua perawatan masih di dapatkan keluhan pusing, akral dingin, konjungtiva pucat namun sudah ada peningkatan hemoglobin. Tetapi pada perawatan hari ketiga klien mengalami perubahan yang cukup baik keluhan yang di rasakan sebelumnya sudah mulai berkurang dan pada saat di lakukan pemeriksaan laboratorium kembali hasilnya ada peningkatan. Efektivitas dari pemberian intervensi bergantung pada kepatuhan dari klien dalam melaksanakan intervensi yang telah diberikan, sehingga diharapkan klien menjadi termotivasi untuk mengurangi resiko ibu hamil dengan cara melaksanakan program-program yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan.

Kata kunci: *asuhan keperawatan, anemia, perfusi perifer tidak efektif*

ABSTRACT

NURSING CARE FOR PREGNANT MOTHER WITH PERIFER PERFUSIONNOT EFFECTIVE IN ANEMIA CASE IN RA. BASOENI MOJOKERTO

BY: CITRA AULIA WULANDARI

Peripheral perfusion is not effective is: decreased blood circulation to peripheral tissues that can disrupt the body's metabolic balance. The purpose of this study is to find out the true picture of the implementation of nursing care on peripheral perfusion clients ineffective in pregnant women with anemia. The research method is a case study. The provision of nursing care starts from the assessment, diagnosis, planning, action and evaluation of nursing. Participants in this study were Two female client aged 28 years and 25 years with anemia in the VK room RA BASOENI Mojokerto Hospital with criteria for decreasing hemoglobin below 11gr / dl. After taking nursing actions for 3x24 hours, the first day of treatment did not show the expected outcome criteria. On the second day of treatment still received complaints of dizziness, acral cold, pale conjunctiva but there has been an increase in hemoglobin. But on the third day of treatment, the client experienced a pretty good change, complaints that were felt before had begun to diminish and at the time of the laboratory check-up the results had improved. The effectiveness of providing interventions depends on the compliance of the client in carrying out the interventions that have been given, so the client is expected to be motivated to reduce the risk of pregnant women by implementing programs that have been provided by health workers.

Keywords: **nursing care, anemia, peripheral perfusion is not effective**