

## **ABSTRAK**

### **ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN MASALAH RISIKO SYOK HIPOVOLEMİK PADA IBU DENGAN PERDARAHAN POSTPARTUM DI RSUD. ANWAR MEDIKA KRIAN SIDOARJO**

**Oleh : Nafi' Atu Amaliyah**

Perdarahan postpartum adalah penyebab utama dari keseluruhan kematian akibat perdarahan obstetrik. Komplikasi perdarahan postpartum adalah syok hemoragik (hipovolemik) dan kematian dapat terjadi akibat perdarahan yang tiba-tiba dan perdarahan yang berlebihan. Tujuan penelitian ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan klien dengan masalah Risiko syok hipovolemik pada perdarahan postpartum di ruang nifas Rumah Sakit Umum Anwar Medika Krian Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan desain studi kasus pendekatan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi menggunakan satu klien dengan masalah keperawatan risiko syok hipovolemik, tempat penelitian di ruang nifas Rumah Sakit Umum Anwar Medika Krian Sidoarjo. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Hasil penelitian setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan bahwa klien pada saat pengkajian data dasar ditemukan data subjektif dan data objektif yang menunjukkan klien mengalami risiko syok hipovolemik. Rencana asuhan sesuai dengan yang diimplementasikan dalam asuhan keperawatan. Intervensi sudah dapat diimplementasikan semua pada hari pertama, namun pada hari kedua menghentikan intervensi berupa anjuran seperti melaporkan jika ada tanda perdarahan, banyak istirahat, membatasi aktivitas, tidur terlentang serta tentang dampak trombosit yang rendah. Klien disarankan untuk melakukan kontrol ulang dan mengonsumsi makanan bergizi.

***Kata kunci: Perdarahan Postpartum, Risiko Syok Hipovolemik.***

## **ABSTRACT**

### **NURSING CARE WITH THE PROBLEM OF THE RISK OF HYPOVOLEMIC SHOCK IN MOTHERS WITH POSTPARTUM HEMORRHAGE AT RSU. ANWAR MEDIKA KRIAN SIDOARJO**

**By: Nafi' Atu Amaliyah**

Postpartum hemorrhage is the leading cause of all deaths due to obstetric hemorrhage. Complications of postpartum hemorrhage are hemorrhagic shock (hypovolemic) and death can occur due to sudden bleeding and excessive bleeding. The purpose of this study was to carry out nursing care for clients with problems with the risk of hypovolemic shock in postpartum hemorrhage in the puerperium ward of Anwar Medika Krian Sidoarjo General Hospital. The research method using a case study design approach to nursing care includes assessment, nursing diagnoses, planning, implementation, evaluation using one client with nursing problems at risk of hypovolemic shock, the place of research is in the puerperium ward of Anwar Medika Krian Sidoarjo General Hospital. Collecting data using interview techniques, observation, physical examination and documentation. The results of the study after nursing care was carried out for 3x24 hours it was found that the client at the time of reviewing the basic data found subjective data and objective data that showed the client was at risk of hypovolemic shock. The plan of care is in accordance with what is implemented in nursing care. All interventions can be implemented on the first day, but on the second day stop the intervention in the form of recommendations such as reporting if there are signs of bleeding, getting plenty of rest, limiting activity, sleeping on your back and about the impact of low platelets. Clients are advised to re-control and consume nutritious foods.

**Keywords:** *risk of hypovolemic shock, hemorraghia post partum.*