

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HIPEREMESIS GRAVIDARUM OLEH ARLINI AISYA MATTO

Latar Belakang Dalam kehamilan mual muntah adalah gejala yang normal dan sering terjadi pada trimester pertama. Namun, apabila berlebihan dapat mengganggu pekerjaan sehari-hari dan keadaan umum menjadi buruk sehingga ibu kekurangan energi dan juga zat gizi yang disebut hiperemesis gravidarum merupakan gangguan yang sering kita jumpai pada kehamilan muda dan dikemukakan oleh 50% dari wanita. (Rofi'ah et al, 2019).

Metode Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2019). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 82 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data sekunder yang diperoleh dari Rekam Medik.

Result Berdasarkan hasil penelitian dari 82 responden didapatkan 65% responden berusia 21-35 Thn, Primigvarida 57% Responden, trimester 1 sebanyak 45% Responden, 71% responden Berpendidikan tinggi, yang tidak bekerja sebanyak 52 responden, penyakit ibu terbanyak adalah Gastritis sebanyak 53% responden.

Analys, Discus Faktor resiko yang resiko paling tinggi adalah primigravida, diikuti usia kehamilan trimister I, pekerjaan. Sehingga perlu edukasi yang banyak kepada ibu dengan kehamilan pertama.

Kata kunci : Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Hiperemesis Gravidarum

ABSTRACT

AFFECTING FACTORS HYPEREMESIS GRAVIDARUM BY ARLINI AISYA MATTO

Background In pregnancy nausea and vomiting is a normal symptom and often occurs in the first trimester. However, if it is excessive, it can interfere with daily work and the general condition becomes worse so that the mother lacks energy and nutrients, which is called hyperemesis gravidarum is a disorder that we often encounter in young pregnancies and is found by 50% of women. (Rofi'ah et al, 2019).

Method The type of research used is descriptive. Descriptive is research that is intended to investigate a condition, situation or other event, then the results will be presented in the form of a research report (Arikunto, 2019). The sample in this study were 82 respondents. Data collection techniques were carried out by taking secondary data obtained from the Medical Record.

Result Based on the results of research from 82 respondents, 65% of respondents aged 21-35 years, Primigvarida 57% of respondents, 1st trimester of 45% of respondents, 71% of respondents with higher education, 52 respondents who do not work, the most maternal disease is Gastritis as much as 53% respondents.

Analys, Discus The risk factor with the highest risk was primigravida, followed by first trimester gestational age, occupation. So it needs a lot of education to mothers with their first pregnancy.

Keywords: Factors Affecting Hyperemesis Gravidarum