

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

5.1.1 Rerata kesadaran kuantitatif pada pasien diruang ICU berdasarkan nilai GCS adalah 8.67 dengan standart devisiasi GCS 3.9.

5.1.2 Sebagian besar kesadaran kualitatif pada pasien diruang ICU RSUD Anwar Medika Sidoarjo adalah Somnolen sebesar 22.5% responden.

#### **5.2 Saran**

##### **5.2.1 Bagi Rumah Sakit**

Bagi rumah sakit bisa menggunakan 2 cara untuk melakukan pengukuran kesadaran pasien di ruang ICU, khususnya pada intervensi keperawatan terhadap pasien dengan kondisi penurunan kesadaran, menggunakan penilaian secara kuantitatif serta kualitatif dikarenakan di ruang ICU memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadinya penurunan kesadaran pada pasien, hal ini digunakan untuk menghindari adanya keterlambatan dalam melakukan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien saat itu.

##### **5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan**

Berdasarkan rekomendasi dari peneliti kepada pihak institusi pendidikan hendaknya memperbanyak literature berupa makalah, seminar, maupun penugasan serta kepustakaan terkait intervensi keperawatan pada pasien dengan penurunan kesadaran di ruang ICU dengan menggunakan

penilaian kesadaran secara kuantitatif dan kualitatif untuk menilai tingkat kesadaran pasien.

### 5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian dengan topik kesadaran pasien yang mana dapat dikembangkan lebih lanjut lagi instrument yang digunakan dalam melakukan penelitian menilai tingkat kesadaran pasien secara kuantitatif dan kualitatif secara menyeluruh dengan cara yang berbeda dengan tidak menggunakan *Gaslow Coma Scale*, serta menilai kesadaran kualitatif dengan cara yang lainnya

