

BAB 5

PENUTUP

Pada bab ini akan membahas simpulan hasil dari penelitian dan saran tentang hubungan tingkat kecemasan dengan lama hari perawatan pasien penyakit jantung koroner di Ruang ICCU RSUD Bangil

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Pada tingkat kecemasan pasien penyakit jantung koroner di Ruang ICCU RSUD Bangil, didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kecemasan sedang yaitu 34 orang (68 %). Sedangkan responden dengan kecemasan ringan yaitu 12 orang (24 %) dan yang memiliki kecemasan berat yaitu 4 orang (8 %).
- 5.1.2 Pada lama hari perawatan pasien penyakit jantung koroner di Ruang ICCU RSUD Bangil, didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden memiliki lama hari perawatan sedang yaitu 34 orang (68 %). Sedangkan responden yang memiliki lama hari perawatan cepat yaitu 14 orang (28 %) dan responden yang memiliki lama hari perawatan lama yaitu 2 orang (4 %).
- 5.1.3 Pada analisis hubungan tingkat kecemasan dengan lama hari perawatan pasien penyakit jantung koroner di Ruang ICCU RSUD Bangil, didapatkan hasil bahwa ada hubungan tingkat kecemasan dengan lama hari perawatan pasien penyakit jantung koroner di Ruang ICCU RSUD Bangil.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi tempat penelitian

Bagi perawat ICCU diharapkan dapat meningkatkan pemberian edukasi terkait proses penyakit untuk mengurangi kecemasan pasien selama masa perawatan di ruang ICCU.

5.2.2 Bagi responden

Bagi pasien untuk pro aktif berkomunikasi dengan perawat dan dokter sehingga diharapkan tidak timbul rasa cemas. Bagi responden dalam proses pengisian kuesioner diharapkan untuk jujur karena akan mempengaruhi hasil dari penelitian

5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan mempersiapkan seseorang yang memahami beberapa bahasa agar proses penelitian lebih efektif dan cepat. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas penelitian dengan menerapkan terapi distraksi yang dapat mengurangi tingkat kecemasan pasien saat menjalani perawatan di ruang ICCU serta menggunakan kriteria penelitian yang lebih spesifik.

5.3 Saran

5.2.4 Bagi tempat penelitian

Bagi perawat ICCU diharapkan dapat meningkatkan pemberian edukasi terkait proses penyakit untuk mengurangi kecemasan pasien selama masa perawatan di ruang ICCU.

5.2.5 Bagi responden

Bagi pasien untuk pro aktif berkomunikasi dengan perawat dan dokter sehingga diharapkan tidak timbul rasa cemas. Bagi responden dalam

proses pengisian kuesioner diharapkan untuk jujur karena akan mempengaruhi hasil dari penelitian

5.2.6 Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan mempersiapkan seseorang yang memahami beberapa bahasa agar proses penelitian lebih efektif dan cepat.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas penelitian dengan menerapkan terapi distraksi yang dapat mengurangi tingkat kecemasan pasien saat menjalani perawatan di ruang ICCU serta menggunakan kriteria penelitian yang lebih spesifik.

