

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Sebagian besar pasien Stroke Non Hemoragik sebelum diberikan mobilisasi miring kanan miring kiri di Ruang 7 RSPAL dr. Ramelan Surabaya kemungkinan terjadi *pressure injury*, 15 orang (62,5%).
2. Sebagian besar pasien Stroke Non Hemoragik sesudah diberikan mobilisasi miring kanan miring kiri di Ruang 7 RSPAL dr. Ramelan Surabaya kemungkinan kecil terjadi *pressure injury*, 13 orang (54,2%).
3. Mobilisasi miring kanan miring kiri efektif dalam mencegah *pressure injury* pada pasien stroke non hemoragik di ruang 7 RSPAL Dr. Ramelan Surabaya yang dibuktikan dengan Uji Wilcoxon Sign Rank didapatkan *p value* sebesar 0,003 kurang dari α (0,05) sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Rumah Sakit

Meningkatkan kualitas perawatan di ruang 7, menambah jumlah perawat, melakukan monitoring kondisi pasien kapan bisa dilakukan mobilisasi miring kanan miring kiri agar dapat menurunkan *pressure injury*, membuat SOP mobilisasi miring kanan miring kiri untuk pencegahan *pressure injury*.

5.2.2 Bagi Perawat

Bagi perawat diharapkan untuk lebih intens lagi dalam memberikan pelayanan keperawatan pada pasien stroke non hemoragik untuk

mengembangkan nilai-nilai professional keperawatan sehingga kinerja keperawatan lebih berkualitas dan dapat mengurangi angka *pressure injury*. Diharapkan setiap shift perawat melakukan mobilisasi miring kanan miring kiri tiap 2 jam untuk mencegah pressure injury

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Melakukan pengembangan penelitian tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi *pressure injury*, mengadakan penelitian yang lebih lagi dan lebih kompleks dengan menambah jumlah responden, mengubah jenis penelitian dan menambah variabel

