

## **ABSTRAK**

### **ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN SIROSIS HEPATIS DENGAN MASALAH KEPERAWATAN RESIKO PERFUSI GASTROINTESTINAL TIDAK EFEKTIF DI RSU ANWAR MEDIKA SIDOARJO**

**OLEH : Rahma Amrina Rosyada**

Sirosis hepatis yakni terjadinya pergantian jaringan hati yang normal digantikan oleh jaringan parut (fibrosis) yang mempengaruhi struktur normal dan regenerasi sel-sel hati yang mengakibatkan rusaknya sel-sel hati dan secara bertahap kehilangan fungsinya. Sirosis hepatis ditandai dengan timbulnya benjolan kecil yang diawali dengan peradangan, kematian jaringan sel hati yang luas, penambahan jaringan ikat secara difus. Kelainan atau gangguan fungsi hati berdampak pada vena portal yang dapat menyebabkan varises esofagus, varises ini mudah pecah sehingga mengakibatkan perdarahan maka timbul masalah keperawatan resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif. Studi kasus ini bertujuan melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien sirosis hepatis dengan masalah keperawatan resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif. Metode deskriptif dalam pendekatan studi kasus pada 2 partisipan yang mengalami resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif pada sirosis hepatis. 2 partisipan laki-laki dengan usia 48 dan 61 tahun mengalami nyeri perut kuadran kanan atas. Perbedaan keluhan yang dialami kedua klien yakni klien 1 dengan keluhan nyeri perut, mual dan nafsu makan sedangkan klien 2 dengan keluhan nyeri perut seperti kembung, mual, nafsu makan menurun dan badan lemas, hal ini dikarenakan kadar hemoglobin klien 2 yang lebih rendah dibandingkan klien 1. Asuhan keperawatan yang diberikan yakni monitor terjadinya perdarahan, monitor nilai hemoglobin dan hematokrit, monitor tanda dan gejala perdarahan massif, pertahankan akses IV, jelaskan tanda-tanda perdarahan, anjurkan membatasi aktifitas dan kolaborasi pemberian tranfusi darah, jika perlu.

**Kata kunci : Sirosis Hepatis, Resiko Perfusi Gastrointestinal Tidak Efektif**

## **ABSTRACT**

### **NURSING CARE OF HEPATIC CIRRHOSIS PATIENTS WITH NURSING PROBLEMS IN EFFECTIVE GASTROINTESTINAL PERFUSION RISK AT ANWAR MEDIKA RSU, SIDOARJO**

**BY : Rahma Amrina Rosyada**

Cirrhosis of the liver, namely the replacement of normal liver tissue by scar tissue (fibrosis) affects the normal structure and regeneration of liver cells which results in damage to liver cells and gradually loses their function. Cirrhosis of the liver is characterized by the emergence of small lumps that are preceded by inflammation, death of extensive liver cell tissue, and diffuse addition of connective tissue. Abnormalities or impaired liver function have an impact on the portal vein which can cause esophageal varices. These varicose veins break easily resulting in bleeding resulting in nursing problems, and the risk of ineffective gastrointestinal perfusion. This case study aims to carry out nursing care in patients with cirrhosis of the liver with nursing problems at risk of ineffective gastrointestinal perfusion. The descriptive method in a case study approach in 2 participants who are at risk of gastrointestinal perfusion is not effective in cirrhosis of the liver. 2 male participants aged 48 and 61 years experienced upper right quadrant abdominal pain. Differences in complaints experienced by the two clients namely client 1 with complaints of abdominal pain, nausea, and appetite while client 2 with complaints of abdominal pain such as bloating, nausea, decreased appetite, and weakness, this is due to client 2's lower hemoglobin level than client 1. The nursing care provided is to monitor bleeding, monitor hemoglobin and hematocrit values, monitor signs and symptoms of massive bleeding, maintain IV access, explain signs of bleeding, suggest limiting activities and collaborate on giving blood transfusions, if necessary.

**Keywords : Cirrhosis of the Hepatitis, Risk of Ineffective Gastrointestinal Perfusion**