

ABSTRAK

FAKTOR PREDIKTOR HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN DI RS ANWAR MEDIKA SIDOARJO

Oleh: Khisbiyah

Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab utama kematian seorang ibu hamil. Hipertensi selama kehamilan memiliki risiko tinggi untuk mengalami penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, gagal jantung, bahkan menyebabkan kematian ibu dan janin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor prediktor hipertensi dalam kehamilan di Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil dengan hipertensi di RS Anwar Medika Sidoarjo, teknik sampling yang digunakan yaitu total sampling, dengan total responden sebanyak 50. Pengolahan data menggunakan uji statistic distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Hasil penelitian berdasarkan faktor usia didapatkan sebagian besar responden dengan rentang usia 25-35 thn mengalami hipertensi derajat 1 sebanyak 21 responden (75.0%), sedangkan responden dengan usia > 35 thn berjumlah 7 responden (25.0%). Sedangkan dari faktor paritas sebagian besar responden memiliki tekanan darah tinggi dengan kategori derajat 1 sebanyak 28 responden (100.0%), diantaranya yaitu responden dengan kehamilan primipara sebanyak 7 responden (25.5%), multipara sebanyak 20 responden (71.4%), dan grandemultipara sebanyak 1 responden (3.6%). Hasil dari faktor riwayat hipertensi sebagian besar ibu hamil memiliki tekanan darah kategori derajat 1 sebanyak 28 responden (100.0%) diantaranya yaitu 16 responden (57.1%) memiliki riwayat hipertensi, dan 12 (42.9%) responden tidak memiliki riwayat hipertensi. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi dalam kehamilan antara lain yaitu faktor usia, paritas dan riwayat hipertensi dan faktor yang paling mendominasi yaitu faktor riwayat hipertensi hal ini dikarnakan hipertensi yang di diderita sebelum hamil mengakibatkan gangguan/kerusakan yang lebih berat dengan timbulnya edema dan proteinuria.

Kata Kunci: Hipertensi, Kehamilan, Paritas, Riwayat Hipertensi, Usia.

ABSTRACT

PREDICTOR FAKTORS OF HYPERTENSION IN PREGNANCY AT ANWAR MEDIKA HOSPITAL SIDOARJO

By: Khisbiyah

Hypertension in pregnancy is the main cause of death for pregnant women. Hypertension during pregnancy has a high risk of experiencing cardiovascular disease such as coronary heart disease, heart failure, and even causes death of the mother and fetus. This study aims to determine the predictor factors of hypertension in pregnancy at Anwar Medika Hospital, Sidoarjo. The design used in this study is descriptive qualitative. The population in this study were all pregnant women with hypertension at Anwar Medika Sidoarjo Hospital, the sampling technique used was total sampling, with a total of 50 respondents. Data processing used statistical tests of frequency distribution and cross tabulation. The results of the study based on the age factor found that most of the respondents with an age range of 25-35 years had grade 1 hypertension with as many as 21 respondents (75,0%), while respondents with ages > 35 years totaled 7 respondents (25,0%). Meanwhile, from the parity factor, most of the respondents had high blood pressure with the degree 1 category of 28 respondents (100,0%), including 7 respondents with primipara pregnancies (25,5%), 20 respondents (71,4%) multiparas, and 1 grandmultiparas. respondents (3,6%). The results of the history of hypertension, most pregnant women have blood pressure category 1 as many as 28 respondents (100.0%), of which 16 respondents (57,1%) have a history of hypertension, and 12 (42,9 %) respondents do not have a history of hypertension. There are many factors that can affect hypertension in pregnancy, including age, parity and history of hypertension and the most dominant factor is a history of hypertension.

Keywords: Hypertension, Pregnancy, Parity, History of Hypertension, Age

BINA SEHAT PPNI