

ABSTRAK

TINGKAT KECEMASAN PASIEN TUBERKULOSIS PARU YANG SEDANG MENJALANI PENGOBATAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS PURI KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh : Reggy Janice Tiven

Kecemasan merupakan salah satu bentuk tekanan psikologis yang dialami oleh penderita yang disebabkan oleh stigma, takut mati dan isolasi pada penderita TB paru sehingga penderita tidak patuh terhadap pengobatan yang menyebabkan pada hasil pengobatan yang jelek. Penderita TB Paru yang mengalami masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan apabila tidak ditangani dengan baik dapat memperburuk pengobatan TB paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien tuberkulosis paru yang sedang menjalani pengobatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan jumlah populasi sebanyak 70 responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 responden dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. Pengumpulan data dengan observasi dan diolah dengan editting, coding dan tabulating. Hasil penelitian didapatkan data bahwa hampir setengah dengan kategori sedang sebanyak 34 responden (48,6%). Pasien TB Paru dapat diberikan edukasi mengenai penyaki TB Paru untuk mengurangi kecemasan pasien tuberculosis yang sedang menjalani pengobatan yakni dengan menerapkan pengobatan medis dan psikologis.

Kata Kunci : Tingkat Kecemasan, Tuberculosis Paru

ABSTRACT

THE LEVEL OF ANXIETY OF PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENTS WHO ARE UNDERGOING TREATMENT IN THE WORK AREA OF PURI REGENCY, MOJOKERTO

By : Reggy Janice Tiven

Patients so that patients do not comply with treatment which causes them to poor treatment outcome. Pulmonary TB patients who experience psychological problems such as depression and anxiety if not handled properly can worsen pulmonary TB treatment. This study aims to determine the level of anxiety of pulmonary tuberculosis patients who are undergoing treatment. This study uses a descriptive research design with a population of 70 respondents. The sample in this study were 70 respondents using *non - probability sampling technique*. Data collection by observation and processed by editing, coding and tabulating. The results showed that almost half of the data in the medium category were 34 respondents (48.6%). Pulmonary TB patients can be given to reduce the anxiety of tuberculosis patients who are undergoing treatment, namely by applying medical and psychological treatment, for example, being given support or support from people closest to them so that patients feel they are really needed.

Keywords: Anxiety Level, Pulmonary Tuberculosis

