

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sebelum diberikan intervensi sebagian sebagian responden mengalami tingkat nyeri post SC skala sedang sebanyak 29 responden (83%) dan sebagian kecil mengalami nyeri ringan sebanyak 6 responden (17%).
2. Setelah diberikan intervensi sebagian besar responden mengalami tingkat nyeri ringan sebanyak 33 responden (94%) dan nyeri sedang 2 responden (6%).
3. Berdasarkan hasil uji *paired T-test* nilai mean 2,91429, Std. deviation 65849, dan nilai (*p-value* <0,01). Jika nilai Sig. (2 -talled) < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara data pretest dan posttest sehingga H1 diterima artinya ada Pengaruh Pemberian Aromaterapi Bitter Orange Terhadap Tingkat Nyeri Luka Post SC di Rumah Sakit Sahabat Sukorejo Pasuruan.

5.2 Saran

1. Bagi Tempat Penelitian

Dengan adanya efektifitas pemberian aromaterapi bitter orange terhadap tingkat nyeri pasien post SC di Rumah Sakit Sahabat Sukorejo Pasuruan, maka dapat diterapkan sebagai terapi nonfarmakologi bagi pasien post SC di Rumah Sakit Sahabat Sukorejo Pasuruan untuk menurunkan tingkat nyeri pasien post SC di Rumah Sakit Sahabat Sukorejo.

2. Bagi Responden

Di harapkan bagi responden atau ibu post SC dapat diterapkan dirumah apabila rasa nyeri muncul.

3. Bagi Petugas Kesehatan

Dengan adanya efektifitas pemberian aromaterapi bitter orange terhadap penurunan tingkat nyeri pasien post SC di Rumah Sakit Sahabat Sukorejo, diharapkan kepada petugas kesehatan dapat digunakan dalam memberikan asuhan terutama bagi pasien post SC dan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh aromaterapi bitter orange terhadap penurunan tingkat nyeri pasien post SC.

