

## ABSTRAK

### GAMBARAN FAKTOR PEMILIHAN PERSALINAN DENGAN OPERASI SC DI RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBUH BANGKALAN Oleh: EVA HINDRIANI DEWI ISLAMI

Persalinan *sectio caesaria* sebagai alternatif persalinan ketika dilakukan persalinan secara normal tidak bisa lagi, ditujukan untuk indikasi medis tertentu, yang terbagi atas indikasi untuk ibu dan indikasi untuk bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pre eklamsia, persalinan lama, bekas SC (BSC), kehamilan post date, gawat janin, ketuban pecah dini, dan malposisi dengan operasi *sectio caesaria*. Metode penelitian deskriptif analitik. Populasi dan sampel adalah seluruh ibu dengan persalinan *sectio caesarea* di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan pada tahun 2023. teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Variabel penelitian ini dibatasi sebagai berikut: Pre eklamsia, Bekas *Sectio caesaria*, partus lama, kehamilan post date, gawat janin, ketuban pecah dini dan malposisi. Instrumen dengan rekam medis (data sekunder). Analisa hanya menggunakan distribusi frekuensi dan presentase. Berdasarkan hasil penelitian faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan persalinan dengan operasi *sectio caesaria* di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan adalah BSC sejumlah 327 (28,9%), pre eklamsia sejumlah 286 (25,2%), malposisi sejumlah 146 (12,9%), post date sejumlah 123 (10,9%), ketuban pecah dini sejumlah 117 (10,3%), partus lama sejumlah 39 (3,4%) dan gawat janin sejumlah 94 (8,3%). Ibu hamil dapat menjaga kondisi tubuh saat kehamilan dari segi asupan nutrisi dan kesehatan selama kehamilan disertai dengan kunjungan antenatal care teratur karena sangat berpengaruh terhadap faktor pemilihan persalinan *sectio caesaria*

**Kata Kunci:** Pemilihan Persalinan, *Sectio Caesaria*,



BINA SEHAT PPNI

## ***ABSTRACT***

### ***DESCRIPTION OF FACTORS IN CHOICE OF DELIVERY WITH SC OPERATION AT SYARIFAH AMBAMI RATO EBUH BANGKALAN HOSPITAL***

**By: EVA HINDRIANI DEWI ISLAMI**

*Caesarean section delivery as an alternative delivery when normal delivery is no longer possible, is intended for certain medical indications, which are divided into indications for the mother and indications for the baby. This study aims to identify factors of pre-eclampsia, prolonged labor, former CS (BSC), post-date pregnancy, fetal distress, premature rupture of membranes, and malposition with caesarean section operation. Analytical descriptive research method. The population and sample are all mothers with caesarean section deliveries at the Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan Regional Hospital in 2023. The sampling technique was purposive sampling. The variables of this study are limited as follows: Pre-eclampsia, former Sectio caesaria, prolonged labor, post-date pregnancy, fetal distress, premature rupture of membranes and malposition. Instrument with medical records (secondary data). The analysis only uses frequency distribution and percentages. Based on research results, the factors that influence the choice of delivery by caesarean section at Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan Regional Hospital are BSC, 327 (28.9%), pre-eclampsia, 286 (25.2%), malposition, 146 (12.9%). %, post date was 123 (10.9%), premature rupture of membranes was 117 (10.3%), prolonged labor was 39 (3.4%) and fetal distress was 94 (8.3%). Pregnant women can maintain their body condition during pregnancy in terms of nutritional and health intake during pregnancy accompanied by regular antenatal care visits because this greatly influences the factors in choosing a caesarean section delivery.*

**Keywords:** *Childbirth Election, Sectio Caesaria*