

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian adalah responden yang mengalami kala II memanjang merupakan responden berusia < 20 tahun sebanyak 14 orang (56%), primipara sebanyak 14 orang (56%). His nya lemah sebanyak 11 responden (44%).

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya jika melakukan penelitian terkait dengan kala II memanjang lebih disarankan untuk menambahkan faktor yang berhubungan dengan kala II memanjang misalnya dengan mengaitkan jarak kelahiran atau dengan usia ibu.

2. Bagi Tempat Penelitian

Di harapkan memberikan sosialisasi terkait dengan komplikasi persalinan agar para ibu yang hamil dapat mengantisipasi adanya kala II memanjang, antisipasi yang dimaksud adalah mengatur jarak kelahiran, menjaga kehamilan dengan selalu melakukan kunjungan ANC sesuai dengan jadwal.

3. Bagi tenaga kesehatan

Sebagai nakes supaya memberikan penyuluhan pada ibu hamil menjelang persalinan, dengan membuat kelas ibu supaya dalam

memberikan arahan pada ibu hamil untuk mengantisipasi kejadian kala II memanjang

