

GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BBLR DI RS KARTINI MOJOSARI

ABSTRAK

BBLR dianggap sebagai penyebab utama kematian bayi terutama pada bulan pertama kehidupan. penyebab kejadian BBLR sangat berkaitan erat dengan kondisi ibu selama masa kehamilan, dan juga karena BBLR merupakan salah satu faktor utama penyebab kematian perinatal dan neonatal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian BBLR.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian Deskriptif Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bayi di RS Kartini Mojosari sebanyak 63 orang Sampel dalam penelitian adalah sebagian dari anggota populasi yaitu sebanyak 54 responden. *Non-probability Sampling* dengan teknik purposive sampling Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi berupa checklis Analisa ini dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran pada masing masing variable penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berdasarkan usia ibu adalah 20-35 tahun sebanyak 44 orang (81,5%). Responden dengan jumlah anak sebanyak 1 anak adalah 21 responden (38,9%). Status ekonomi responden sebagian besar adalah menengah dengan gaji per bulan sebesar Rp. 1.000.000 s/d 1.500.000 sebanyak 26 responden (48,1%).

Sebagian besar responden berdasarkan usia kehamilannya adalah > 37 minggu sebanyak 36 orang (66,7%). Sebagian besar responden tidak mempunyai riwayat abortus sebanyak sebanyak 42 orang (77,8%)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan terutama tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR.

Kata Kunci : BBLR, Faktor Usia, Ekonomi

BINA SEHAT PPNI

OVERVIEW OF FACTORS INFLUENCING THE INCIDENT OF LBW AT KARTINI MOJOSARI HOSPITAL

ABSTRACT

LBW is considered the main cause of infant death, especially in the first month of life. The cause of LBW is closely related to the condition of the mother during pregnancy, and also because LBW is one of the main factors causing perinatal and neonatal deaths. This study aims to determine the description of the factors that influence the incidence of LBW.

This research method is qualitative research with a descriptive research design. The population in this study is all 63 babies at Kartini Mojosari Hospital. The sample in the research is part of the population, namely 54 respondents. Non-probability sampling using purposive sampling technique. The research instrument used in this study was an observation sheet in the form of a checklist. This analysis was used to get a picture of each research variable, namely the factors that influence the incidence of LBW.

The research results showed that the majority of respondents based on maternal age were 20-35 years as many as 44 people (81.5%). Respondents with 1 child were 21 respondents (38.9%). The economic status of most respondents is middle class with a monthly salary of Rp. 1,000,000 to 1,500,000 as many as 26 respondents (48.1%).

Most respondents based on their gestational age were > 37 weeks as many as 36 people (66.7%). Most respondents did not have a history of abortion as many as 42 people (77.8%).

It is hoped that the results of this research can be developed, especially regarding the factors that influence the incidence of LBW.

Keywords: LBW, age factors, economy

BINA SEHAT PPNI