

ABSTRAC

ANALYSIS OF FACTORS CAUSING POSTPARTUM BLEEDING IN PARTICULAR WOMEN

BY : RIF'ATUL AMINAH

Postpartum hemorrhage is still the highest cause of maternal death. Even in the VK Room at Syarifah Ambami Rato Ebu Hospital, Bangkalan Regency, the incidence of postpartum hemorrhage was 29.4%. The aim of the research is to analyze the factors that cause postpartum hemorrhage in women giving birth in the VK Room at Syarifah Ambami Rato Ebu Regional Hospital, Bangkalan Regency. This thesis analyzes the factors that cause postpartum hemorrhage in mothers giving birth. Research was conducted to evaluate risk factors that can influence the incidence of postpartum hemorrhage and provide appropriate preventive solutions. The research method involves collecting data from parturient mothers who experience postpartum hemorrhage, using secondary data originating from the patient's medical records or ERM over a period of one year, namely from January 2023 to December 2023. Statistical analysis is used to identify relationships between factors. -identified risk factors. It is hoped that the research results can contribute to efforts to improve maternal health. In cases of postpartum hemorrhage that occurred in the VK Room at Bangkalan Regional Hospital in 2023, 10 people or around 7.5% were caused by lacerations. This number is quite small compared to postpartum hemorrhage due to uterine atony (24.6%) or placental retention (67.9%). Bleeding due to lacerations can occur due to tears during childbirth, either spontaneously or by action. From this research, it is necessary to prevent and treat postpartum hemorrhage by increasing the understanding of health workers regarding early identification of risk factors for postpartum hemorrhage, developing clear protocols and guidelines for the management of postpartum hemorrhage, as well as involving families as part of postpartum support and monitoring, improving quality Prenatal and intrapartum care is also considered important. By taking these steps, it is hoped that we can reduce the incidence of postpartum hemorrhage and improve the overall health of women in labor.

Keyword : Nutritional Status, Fe Tablets, Postpartum Bleeding

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERDARAHAN POSTPARTUM PADA IBU BERSALIN

OLEH : RIF'ATUL AMINAH

Perdarahan postpartum hingga kini masih menjadi penyebab kematian ibu tertinggi. Bahkan di Ruang VK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan kejadian perdarahan postpartum sebesar 29,4%. Tujuan penelitian yaitu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum pada ibu bersalin di Ruang VK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan. Skripsi ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perdarahan postpartum pada ibu bersalin. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian perdarahan postpartum serta menyajikan solusi pencegahan yang tepat. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data dari ibu bersalin yang mengalami perdarahan postpartum, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari rekam medis atau ERM pasien selama kurun waktu satu tahun, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Analisis statistik digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor risiko yang diidentifikasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan maternal. Dalam kasus perdarahan postpartum yang terjadi di Ruang VK RSUD Bangkalan tahun 2023, yang disebabkan oleh laserasi adalah 10 orang atau sekitar 7,5%. Jumlah ini cukup sedikit jika dibandingkan dengan perdarahan postpartum akibat atonia uteri (24,6%) atau retensio plasenta (67,9%). Perdarahan akibat laserasi ini dapat terjadi karena robekan pada masa persalinan, baik secara spontan atau dengan tindakan. Dari penelitian ini, maka diperlukan adanya pencegahan dan penanganan perdarahan postpartum dengan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terkait identifikasi dini faktor risiko perdarahan postpartum, pengembangan protokol dan pedoman yang jelas untuk manajemen perdarahan postpartum, serta pelibatan keluarga sebagai bagian dari dukungan dan pemantauan pasca persalinan, peningkatan kualitas perawatan prenatal dan intrapartum juga dianggap penting. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi insiden perdarahan postpartum dan meningkatkan kesehatan ibu bersalin secara keseluruhan.

Kata Kunci : Perdarahan Postpartum, Ibu Bersalin, Faktor Penyebab