

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan juga dari hasil analisis faktor penyebab terjadinya perdarahan postpartum pada ibu bersalin, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor seperti atonia uteri, retensio plasenta dan laserasi jalan lahir, memiliki korelasi signifikan dengan kejadian perdarahan postpartum. Temuan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang aspek-aspek yang dapat diintervensi untuk mengurangi resiko perdarahan postpartum. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang terarah dan efektif dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesehatan ibu bersalin.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan perdarahan postpartum, yaitu :

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi tentang faktor resiko terjadinya perdarahan postpartum.

b. Praktis

Peningkatan pemahaman tenaga kesehatan terkait identifikasi dini faktor risiko perdarahan postpartum. Kedua, pengembangan protokol dan pedoman yang jelas untuk manajemen perdarahan postpartum.

c. Masyarakat / Keluarga

Selanjutnya, pelibatan keluarga sebagai bagian dari dukungan dan pemantauan pasca persalinan. Peningkatan kualitas perawatan prenatal dan intrapartum juga dianggap penting. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi insiden perdarahan postpartum dan meningkatkan kesehatan ibu bersalin secara keseluruhan.

d. Teman Sejawat (Bidan)

Kepada teman sejawat bidan, agar lebih memahami gejala klinis dan penanganan awal pada ibu postpartum yang

