

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN

PADA NY, N PADA MASA NIFAS SAMPAI KB DAN NEONATUS DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Oleh : NOFITA M. BAUN

Pemberian Asuhan *Continuity Of Care* Yang Akan Dilaksanakan Oleh Bidan Secara Berkesinambungan Pada Ibu Nifas, Bayi Baru Lahir Serta Akseptor Kb, Dengan Tujuan Untuk Mengurangi Resiko Tinggi Dan Yang Akan Menyebabkan Terjadinya Komplikasi Yang Mengarah Ke Kematiaan Pada Ibu Dan Bayi. Penulis Melakukan Pendampingan Pada Ny, N Usia 21 Tahun Dengan Melakukan Kunjungan Pada Masa Sifas, Neonates Dan Kb Serta Memberikan Asuhan Sesuai Dengan Kebutuhan Ibu Dan Bayi.

Asuhan Pada Ny, N Diberikan Mulai Pada Tanggal 22 Februari 2021 Sampai 3 April 2021 Sebanyak 8x Kunjungan, Yakni 4x Kunjungan Nifas, 3x Kunjungan Neonates, Dan 1x Kunjungan Kb. Hasilnya Dari Kunjungan Masa Nifas Ibu Mengelurkan Nyeri Yang Berasal Dari payudara bengkak danra Keluhan Yang Dirasakan Ibu Dalam Batas Fisiologis. Pada Kunjungan Neonates Tidak Ada Yang Dilakukan, Kb Ibu Sudah Sepakat Untuk Menggunakan Kb Suntik 3 Bulan.

Dengan Demikian Disampaikan Bahwa Asuhan Secara *Continuity Of Care* Yang Dilakukan Pada Ny, N Berjalan Dengan Lancar Dan Normal Tanpa Komplikasi Apapun.

Diharapkan Dengan Adanya Asuhan Kebidanan Yang Berkesinambungan Pada Masa Nifas, Neonates, Dan Kb Dapat Mempengaruhi Resiko Tinggi Dan Yang Akan Menyebabkan Aki Dan Kb Meningkat Serta Memungkinkan Perempuan Untuk Berpartisipasi Dalam Mengambil Keputusan Tentang Kesehatan Ibu Dan Bayinya

ABSTRACK

ASUHAN KEBIDANAN

PADA NY, N PADA MASA NIFAS SAMPAI KB DAN NEONATUS DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Oleh : NOFITA M. BAUN

Providing continuity of care that will be carried out by midwives on an ongoing basis for postpartum mothers, new born babies and family planning acceptors, with the aim of reducing high risks and which will cause complications that lead to death in mothers and babies. The author provides assistance to Mrs.

Care for Mrs. The results of the postpartum visit were that the mother expressed pain originating from swollen breasts and the complaints felt by the mother were within physiological limits. At the neonate visit nothing was done, the mother's family had agreed to use birth control injections for 3 months.

Thus, it is conveyed that the continuity of care provided to Mrs. N is running smoothly and normally without any complications.

It is hoped that the existence of continuous midwifery care during the postpartum, neonate and birth control period can influence the high risks and will cause the battery and birth control to increase and enable women to participate in making decisions about the health of mothers and their babies.