

## **ABSTRACT**

### **GAMBARAN TINGKAT DEPRESI PADA PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI**

**OLEH : EKA INGGRI UJI UTAMI**

Breast cancer stems from the development of invasive and non-invasive abnormal tissues in the breast which could cause death. One of the management of breast cancer was chemotherapy, which had an impact on the patient's physical psychological aspects. The psychological impact caused was depression. This study aims to analyzed the description of the level of depression in breast cancer patients undergoing chemotherapy at leprosy hospital of Sumber glagah Mojokerto. The design of this research was descriptive. The population in this study were all breast cancer patients who underwent chemotherapy totalling 74 respondents from May to June 2020, sample in this study was 40 respondents who were taken by consecutive sampling. Variable of this research was the depression's level. Based on the DASS 21 measurement scale. The data were analyzed descriptively by percentage. The results showed 32.5% of respondents had mild depression, 32.5% of respondents had moderate depression and 7.5% of respondents had very severe depression. Chemotherapy treatment will affect the patient's psychological condition. Psychological burdens such as extreme sadness and pessimism about the future can make the patient frustrate and depress.

***Keywords: Depression Rates, Breast Cancer, Chemotherapy***

## **ABSTRAK**

### **GAMBARAN TINGKAT DEPRESI PADA PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI**

**OLEH : EKA INGGRI UJI UTAMI**

Penyakit Kanker payudara bermula dari hasil perkembangan jaringan-jaringan abnormal bersifat invasif atau non invasif pada payudara yang dapat menyebabkan kematian. Penatalaksanaan kanker payudara salah satunya yaitu kemoterapi yang memberikan dampak pada aspek fisik dan psikologis pasien. Dampak psikologis yang ditimbulkan yaitu depresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gambaran tingkat depresi pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto. Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah semua pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi berjumlah 74 responden dari bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2020, sehingga didapatkan Besar Sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang yang diambil dengan cara *Consecutive sampling*. Variabel penelitian ini yaitu Tingkat Depresi. Data diambil dengan menggunakan Kuisioner Tingkat Depresi Berdasarkan skala pengukuran DASS 42. Data analisis secara diskriptif dengan presentase. Hasil penelitian menunjukkan (32,5%) responden mengalami depresi ringan, (32,5%) responden mengalami depresi sedang dan (7,5%) responden mengalami depresi sangat berat. Pengobatan kemoterapi akan mempengaruhi kondisi psikologis pasien. Beban psikologis pasien seperti merasa sedih luar biasa, pesimis terhadap masa depan dapat membuat pasien menjadi frustasi dan depresi.

**Kata kunci:** Tingkat Depresi, Kanker Payudara, Kemoterapi

