

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Pengkajian dilakukan pada klien secara objektif. Tanda objektif yang muncul pada klien 1 adalah TD: 147/73 mmHg, Nadi:100x/menit, RR: 20x/menit, Suhu: 37°C, SPO2: 99%, Kesadaran: delirium, GCS: E:2 V:X M:5, Pupil anisokhor $2/x$, Reflek cahaya $+/x$, Respon pupil terhadap cahaya lambat, Terdapat edema palpebra dekstra, Terdapat hemiparese sinistra, Hasil CT Scan kepala: EDH volume $+/-$ 9ml di convexitas parietal sinistra dengan pneumocephalus, SDH volume $+/-$ 4ml di convexitas parietal dextra, ICH volume $+/-$ 4,3ml di capsula interna dextra, SAH dan IVH, Edema cerebri. Sedangkan pada klien 2 TD: 146/85 mmHg, Nadi:102x/menit, RR: 20x/menit, Suhu: 37,1°C, SPO2: 100%, Kesadaran: Stupor, GCS: E:2 V:X M:4, Pupil isokhor $2/2$, Reflek cahaya $+/+$, Respon pupil terhadap cahaya lambat, Terdapat hemiparese dekstra, Hasil CT Scan Kepala: SDH (vol= 14,8cc) di conveksitas lobus temporal kanan, EDH (vol= 43cc) di conveksitas lobus parietal kiri, SAH, Edema cerebri.

5.1.2 Diagnosa keperawatan pada klien 1 dan klien 2 adalah perfusi jaringan serebral tidak efektif berhubungan dengan edema otak

- 5.1.3** Rencana tindakan dari intervensi yang diberikan yang paling efektif adalah berikan posisi head up 30°, posisikan kepala dan leher netral, dan kolaborasi dalam pemberian diuretik. Dimana ketiga intervensi tersebut dapat membantu menurunkan tekanan intrakranial dengan cara meningkatkan drainase sesuai gravitasi melalui pembuluh darah vena dan dapat mengurangi edema serebral
- 5.1.4** Implementasi pada masalah keperawatan perfusi jaringan serebral tidak efektif telah dilakukan selama 3 hari berturut-turut sesuai intervensi yang ditetapkan. Keberhasilan dari perawatan dan pengobatan tergantung dari kerjasama antara kondisi klien, keluarga dan kerjasama tim medis
- 5.1.5** Evaluasi pada klien 1 masalah perfusi jaringan serebral tidak efektif teratasi pada hari ketiga. Dimana klien telah menunjukkan tingkat kesadaran yang terus meningkat, tidak ada tanda-tanda peningkatan TIK, gelisah menurun, TD membaik dalam batas normal, klien sudah tidak terpasang ventilator. Sedangkan pada klien 2 masalah perfusi jaringan serebral tidak efektif teratasi sebagian. Karena pada hari ketiga perawatan tingkat kesadaran klien belum meningkat secara signifikan, gelisah pada klien masih belum menurun, dan klien masih terpasang ventilator.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Keluarga

Diharapkan keluarga mampu memberikan motivasi dalam proses penyembuhan klien dan juga keluarga dapat memberikan stimulus agar klien juga termotivasi untuk sembuh.

5.2.2 Bagi Perawat

Bagi perawat jika ada pasien cedera otak berat dengan masalah perfusi jaringan serebral tidak efektif bisa lebih mengenali gejala yang mengarah ke diagnosa keperawatan tersebut seperti adanya penurunan kesadaran, adanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (reflek cushing), adanya perlambatan atau ketidaksimetrisan respon pupil.