

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN MASALAH HIPOVOLEMIA PADA KASUS GASTROENTERITIS DI RSI SAKINAH MOJOKERTO

Oleh :

RIRIN FITRIA NINGSIH

Gastroenteritis disebabkan oleh infeksi atau makanan yang terkontaminasi dan lambung mengalami iritasi sehingga kuman masuk dan usus bekerja tidak sempurna, dari sini terjadi infeksi bakteri yang menyebabkan inflamasi dan mengeluarkan toksin yang menyebabkan frekuensi BAB meningkat, yang mengakibatkan hilangnya cairan dan elektrolit yang berlebihan. Sebagian dari penderita (1-2%) akan jatuh kedalam dehidrasi dan kalau tidak segera ditolong 50-60% diantaranya dapat meninggal. Tujuan penelitian ini mampu melaksanakan asuhan keperawatan Hipovolemia pada kasus Gastroenteritis. Metode yang digunakan adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus. Partisipam pada studi kasus ini 1 partisipan dengan masalah Hipovolemia. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Dari data pengkajian yang didapat klien pasien mengeluh sakit perut dan BAB cair, badan panas dan mengeluh haus, nadi teraba lemah, akral hangat, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, keadaan lemah. Setelah membuat perencanaan, peneliti melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan perencanaan yaitu monitor intake dan output, kolaborasi pemberian IV isotonis dan oralit serta pemeriksaan penunjang untuk mendukung ditegakkan diagnosa hipovolemia. Dari data yang diperoleh mulai dari pengkajian sampai evaluasi didapatkan, pada klien dengan hipovolemia dikatakan masalah teratasi jika BAB normal, membran mukosa basah, turgor kulit dalam batas normal, tanda-tanda vital dalam batas normal. Dari kriteria hasil yang disimpulkan maka klien dengan hipovolemia lebih ditekankan untuk pemenuhan balance cairan atau hidrasi untuk mendapatkan kriteria hasil yang ditetapkan.

Kata Kunci : Gastroenteritis, Anak, Hipovolemia

ABSTRACT

NURSING CARE OF CHILDREN WITH HYPOVOLEMIA PROBLEMS IN CASES OF GASTROENTERITIS IN SAKINAH ISLAMIC HOSPITAL MOJOKERTO

By :

RIRIN FITRIA NINGSIH

Gastroenteritis is caused by infection or contaminated food and the stomach was irritating so that germs entered and the intestine worked imperfectly, from here there was a bacterial infection that caused inflammation and secretes toxins which caused the frequency of defecate increased, resulted in excessive loss of fluid and electrolytes. Some of suffered (1-2%) would fall into dehydration and if not immediately helped 50-60% of the popularity could die. The purposed of this study was able to carried out hypovolemia nursing care in cases of Gastroenteritis. The method used was descriptive in the form of case studied. Participants in this case studied 1 participant with hypovolemia problems. Data collection techniques included interview, physical examination, and documentation. From assessment data obtained by client patients were complain of abdominal pain and diarrhea, fever and complained hungry, palpable pulsed weak, warm acral, dry lip mucosa, decreased skin turgor, weak state. After made a plan, researchers carried out nursing actions in accordance with the plan that was monitoring intake and output, colaboration gave fluid IV isotonis, oralit, and investigated to support the diagnosis of hypovolemia. From data obtained from assessment to evaluation obtained, in clients with hypovolemia, the problem was resolve if diarrhea normal, wet mucous membrane, skin turgor within normal limits, vital signs within normal limits. From the inferred outcome criteria, the client with hypovolemia was more emphasized to fulfill fluid balance or hydration to got the specified outcome criteria.

Keywords : Gastroenteritis, Children, Hypovolemia