

**ABSTRAK**

**ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN MASALAH RISIKO**

**DEFISIT NUTRISI PADA PASIEN TYPHOID**

**DI PKM BANGSAL MOJOKERTO**

**OLEH: FANNY WAHYU LESTARI**

Typhoid merupakan penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh bakteri salmonella typhi. Penularan typhoid melalui fecal dan oral yang masuk kedalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Tujuan dari asuhan keperawatan ini adalah melakukan Asuhan Keperawatan pada anak yang mengalami typhoid dengan risiko defisit nutrisi di PKM Bangsal Kabupaten Mojokerto Metode yang digunakan dalam melakukan asuhan keperawatan adalah metode Case Study dalam bentuk studi kasus. Partisipan pada studi kasus ini adalah 1 partisipan dengan masalah risiko defisit nutrisi teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengkajian yang di dapat klien mengalami nafsu makna menurun, anoreksia. Intervensi Risiko defisit nutrisi yang diberikan yaitu berikan makanan sedikit tapi sering. Setelah dilakukan asuhan keperawatan risiko defisit nutrisi pasien dapat teratasi dengan adanya peningkatan nafsu makan. Pemberian edukasi kepada keluarga dalam menjaga pola makan anak agar anak tidak makan-makanan sembarangan. dan yang paling efektif yang bisa mengatasi masalah risiko defisit nutrisi adalah memberikan makanan sedikit tapi sering karena hal itu dapat meningkatkan nafsu makan anak, sehingga bisa mencegah terjadinya risiko defisit nutrisi

**Kata Kunci : Typhoid, Risiko defisit nutrisi**

**ABSTRACT**  
**NURSING WITH RISK PROBLEMS**  
**NUTRITION DEFICITION IN TYPHOID PATIENTS**  
**IN PKM BANGSAL MOJOKERTO**

**BY: FANNY WAHYU LESTARI**

Typhoid is an acute infection of the small intestine caused by the bacteria salmonella typhi. Transmission of typhoid through the fecal and oral route that enters the human body through contaminated food and drink. The purpose of this nursing care is to provide nursing care to children with typhoid with a risk of nutritional deficits in the PKM Ward, Mojokerto Regency. The method used in nursing care is the case study method in the form of a case study. Participants in this case study were 1 participant with a nutritional deficit risk problem. Data collection techniques included interviews, observation, physical examination and documentation. The results showed the assessment that the client experienced decreased sense of desire, anorexia. Intervention Risk of nutritional deficit is given small but frequent feeds. After nursing care, the risk of a patient's nutritional deficits can be resolved by an increase in appetite. Providing education to families in maintaining children's diet so that children do not eat food carelessly. and the most effective way to overcome the problem of the risk of nutritional deficits is to provide small amounts of food but often because it can increase the child's appetite, so that it can prevent the risk of nutritional deficits

**Keywords:** Typhoid, Risk of nutritional deficits