

ABSTRAK

HUBUNGAN KETERATURAN KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh :

ISFINI

Anemia pada kehamilan terjadi akibat kekurangan zat besi karena kurangnya asupan unsur besi dalam makanan. Anemia pada kehamilan rentan terjadi pada ibu hamil yang tidak teratur dalam melakukan kunjungan ANC selama kehamilannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keteraturan kunjungan antenatal care (ANC) dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Desain penelitian ini yaitu analitik korelasional dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi penelitian yaitu seluruh ibu hamil dengan anemia trimester III di Puskesmas Dlanggu Kabupaten Mojokerto sebanyak 35 responden. Besar sampel 22 responden yang di peroleh dengan teknik sampling menggunakan *purposive sampling*. Variable independennya adalah kunjungan antenatal (ANC) dan variable dependennya adalah anemia pada ibu hamil trimester III. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar tidak teratur melakukan kunjungan antenatal care (ANC) yang mengalami anemia ringan 11 responden (50,0%). Dengan menggunakan *uji signifikansi spearman rank* = $0,001 < 0,05$, artinya terdapat hubungan keteraturan kunjungan antenatal care (ANC) dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III, karena jika ibu tidak teratur melakukan kunjungan antenatal care (ANC) maka ibu mengalami anemia. Semakin teratur dalam melakukan kunjungan antenatal care (ANC) maka akan semakin berkurang resiko anemia.

Kata kunci : Keteraturan Kunjungan ANC, Kejadian anemia

ABSTRAK

HUBUNGAN KETERATURAN KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh :

ISFINI

Anemia in pregnancy results from iron deficiency due to lack of iron intake in food. Anemia in prone pregnancies occurs in irregular pregnant women during ANC visits during their pregnancy. The purpose of this study was to determine the relationship between the regularity of antenatal care visits (ANC) and the incidence of anemia in third trimester pregnant women at the Dlanggu Health Center in Mojokerto Regency. The design of this study is correlational analytic with cross sectional approach. The study population included all pregnant women with anemia in the third trimester of health in the Mojokero district with 35 respondents. The sample size of 22 respondents obtained by the sampling technique used purposive sampling. The independent variable is antenatal visit (ANC) and dependent variable is anemia in third trimester pregnant women. The results of the study showed that most of them were irregular in conducting antenatal care (ANC) visits that experienced mild anemia 11 respondents (50.0%). By using the rank spearmen significance test = $0.001 < 0.05$, it means that there is an orderly relationship between antenatal care (ANC) and the incidence of anemia in third trimester pregnant women, because if the mother does not regularly attend antenatal care (ANC), the mother experiences anemia. The more regular the antenatal care visit (ANC), the less the risk of anemia will be reduced.

Keywords: Regularity of ANC Visits, anemia events