

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala menggunakan penilaian FOUR Score di IGD RSI Sakinah Mojokerto, diperoleh hasil bahwa dari 27 responden, pasien dengan cedera kepala ringan sebanyak 19 responden memiliki nilai FOUR Score dengan Q1 sebesar 15,5, Q3 sebesar 16, dan IQR sebesar 0,5. Pada pasien dengan cedera kepala sedang sebanyak 6 responden diperoleh nilai Q1 sebesar 10,25, Q3 sebesar 11,75, dan IQR sebesar 1,5. Sedangkan pada pasien dengan cedera kepala berat sebanyak 2 responden diperoleh nilai Q1 sebesar 7,25, Q3 sebesar 7,75, dan IQR sebesar 0,5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai FOUR Score cenderung lebih tinggi pada cedera kepala ringan dan mengalami penurunan pada cedera kepala sedang hingga cedera kepala berat, sehingga menggambarkan bahwa peningkatan derajat keparahan cedera kepala cenderung diikuti dengan penurunan tingkat kesadaran responden.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mempertimbangkan penggunaan FOUR Score sebagai salah satu instrumen penilaian tingkat kesadaran

pada pasien cedera kepala, serta sebagai dasar pengembangan analisis dan evaluasi kondisi neurologis pasien secara berkelanjutan.

5.2.2 Bagi Pasien

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasien cedera kepala melalui penerapan FOUR Score sebagai metode penilaian tingkat kesadaran yang lebih akurat.

5.2.2 Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa bidang kesehatan, khususnya dalam kajian keperawatan gawat darurat dan keperawatan neurologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penggunaan FOUR Score dalam penilaian tingkat kesadaran pasien cedera kepala serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengkajian neurologis.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian terkait penggunaan FOUR Score dengan jumlah responden yang lebih besar serta mengkaji faktor neurologi, metabolik, farmakologi, dan oksigenasi yang dapat memengaruhi tingkat kesadaran pasien cedera kepala.