

## ABSTRAK

### KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN *SECTIO CAESAREA* (SC) PRETERM DI RS PKU MUHAMMADIYAH CEPU KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

OLEH : ULIL LAILATI NURFAIZAH

Persalinan preterm melalui *sectio caesarea* (SC) merupakan kondisi obstetri yang berisiko terhadap kesehatan ibu dan janin. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik ibu bersalin dengan *sectio caesarea* preterm di RS PKU Muhammadiyah Cepu. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Data sekunder diperoleh dari rekam medis elektronik ibu bersalin yang menjalani tindakan SC preterm (<37 minggu) pada periode Januari–Oktober 2025. Sampel penelitian berjumlah 134 responden yang diambil dengan teknik *total sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu bersalin dengan SC preterm berada pada usia 20–35 tahun (76,1%), berstatus multipara (58,2%), dan memiliki jarak kehamilan  $\geq 2$  tahun (54,5%). Riwayat obstetri yang dominan adalah riwayat SC sebelumnya (38%) dan kelainan letak janin (31,3%). Komplikasi kehamilan yang paling sering ditemukan adalah ketuban pecah dini (59%). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan SC preterm umumnya dilakukan berdasarkan indikasi medis yang berkaitan dengan riwayat obstetri dan komplikasi kehamilan.

Kata kunci: *sectio caesarea* preterm, karakteristik ibu, komplikasi kehamilan

## **ABSTRACT**

### **CHARACTERISTICS OF MOTHERS UNDERGOING PRETERM CESAREAN SECTION AT PKU MUHAMMADIYAH CEPU HOSPITAL, CEPU DISTRICT, BLORA REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE**

**BY: ULIL LAILATI NURFAIZAH**

*Preterm delivery by cesarean section (CS) is an obstetric condition associated with increased risks to both maternal and fetal health. This study aimed to describe the characteristics of mothers undergoing preterm cesarean section at PKU Muhammadiyah Cepu Hospital. This study employed a descriptive observational design with a cross-sectional approach. Secondary data were obtained from electronic medical records of mothers who underwent preterm cesarean section (<37 weeks of gestation) during the period of January–October 2025. A total of 134 respondents were included using a total sampling technique. The results showed that most mothers who underwent preterm cesarean section were aged 20–35 years (76.1%), multiparous (58.2%), and had an interpregnancy interval of  $\geq 2$  years (54.5%). The most common obstetric history was previous cesarean section (38%) and abnormal fetal presentation (31.3%). Premature rupture of membranes was the most frequent pregnancy complication (59%). In conclusion, preterm cesarean section is generally performed based on medical indications related to obstetric history and pregnancy complications.*

*Keywords: preterm cesarean*