

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa sebagian besar (69,1%) responden memiliki dukungan keluarga yang tinggi.
2. Bahwa sebagian besar (47%) responden memiliki kepatuhan minum obat dalam kategori tinggi.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi. Dimana semakin tinggi dukungan yang diberikan oleh keluarga, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan penderita hipertensi dalam minum obat.

5.2 Saran

1. Bagi Keluarga Penderita Hipertensi

Untuk anggota keluarga penderita hipertensi diharapkan dapat memberikan dukungan yang tinggi kepada penderita hipertensi sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kepatuhan minum obat.

2. Bagi Puskesmas

Diharapkan pihak puskesmas dapat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada penderita hipertensi dan keluarga untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat pada penderita

hipertensi, antara lain: faktor tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, motivasi, dukungan petugas kesehatan, tingkat ekonomi, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, dan akses jangkauan pelayanan kesehatan.

