

ABSTRAK

GAMBARAN TRIASE ESI DI IGD RS MUTIARA HATI MOJOKERTO

OLEH : NUR FAZLUR RAHMAN

Triase merupakan proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan untuk menentukan prioritas pelayanan di IGD. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah ESI yang mengelompokkan pasien kedalam 5 tingkat berdasarkan tingkat kegawatan dan kebutuhan sumberdaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran triase ESI di IGD RS Mutiara Hati Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian merupakan data pasien yang mendapatkan pelayanan di IGD RS Mutiara Hati Mojokerto selama periode februari, dengan jumlah 262 pasien. Pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar observasi dan data rekam medis, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan kategori ESI 1 sebanyak 5 pasien (1,9%), ESI 2 sebanyak 12 pasien (4,6%), ESI 3 sebanyak 100 pasien (38,2%), ESI 4 sebanyak 45 pasien (17,2 %), dan ESI 5 sebanyak 100 pasien (38,2%). Kategori ESI 3 dan ESI 5 merupakan kategori dengan jumlah pasien terbanyak, sedangkan ESI 1 merupakan kategori dengan jumlah pasien paling sedikit. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa gambaran triase ESI di IGD RS Mutiara Hati Mojokerto didominasi oleh pasien dengan kategori ESI 3 dan ESI 5, sementara pasien dengan kondisi yang memerlukan resusitasi segera (ESI 1) memiliki proporsi paling rendah.

Kata kunci: Triase, ESI, IGD, Pasien.

ABSTRACT

OVERVIEW OF ESI TRIAGE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT OF MUTIARA HATI HOSPITAL, MOJOKERTO

BY: NUR FAZLUR RAHMAN

Triage is the process of categorizing patients based on the severity of their condition to determine service priorities in the Emergency Department (ED). One method that can be employed is the Emergency Severity Index (ESI), which classifies patients into five levels based on acuity and resource needs. This study aims to describe ESI triage practices in the ED of Mutiara Hati Hospital, Mojokerto. A descriptive method with a quantitative approach was used. The study sample consisted of data from 262 patients who received care in the ED of Mutiara Hati Hospital, Mojokerto, during February. Data were collected using observation sheets and medical records, then analyzed descriptively using frequency distributions and percentages. The results showed the following patient distribution: ESI 1 (5 patients; 1.9%), ESI 2 (12 patient; 4.6%), ESI 3 (100 patients; 38.2%), ESI 4 (45 patients; 17.2%), and ESI 5 (100 patients; 38.2%). Categories ESI 3 and ESI 5 accounted for the highest number of patients, while ESI 1 accounted for the lowest. The study concludes that ESI triage in the ED of Mutiara Hati Hospital, Mojokerto, is dominated by patients in categories ESI 3 and ESI 5, whereas patients requiring immediate resuscitation (ESI 1) represent the smallest proportion.

Keywords: Triage, ESI, Emergency Department, Patients.